

予防接種について



・井手町では4種類の予防接種を推奨しています

	BCG	ポリオ	三種混合	麻しん・風しん
対象となる病気	結核	急性灰白髄炎	百日咳 破傷風 ジフテリア	はしか 風しん
接種する期間	生後6ヶ月未満	生後3～90ヶ月 (7歳半)未満	生後3～90ヶ月 (7歳半)未満	第1期生後12～24ヶ月未満 第2期5歳以上～7歳未満
接種する回数	1回	2回	3回+追加1回	2回
実施している場所	保健センター	保健センター	医療機関	医療機関
実施している月	4・6・8・10・12・2月	4・5・10・11月	病院に問い合わせ して下さい	病院に問い合わせ して下さい

結核：だるい・37度前後の発熱、人にうつす危険のある場合は病院へ入院

急性灰白髄炎：かぜのような症状・重症化すると麻痺を残す病気

百日咳：かぜのような症状・せきがひどく呼吸しにくくなる病気

破傷風：けいれんを起こす病気


ジフテリア：高熱・せき、重症化すると神経麻痺を起す病気

はしか：発熱・発疹がでる、まれに肺炎や脳炎を起こす病気


風しん：発熱・発疹がでる

接種する間隔

ポリオ




三種混合



三種混合最終接種日から1～1年半のあいだに追加でもう1回接種する

接種間隔



予防接種に必要な持ち物：母子手帳・予診票

予防接種ガイドブックは事前に読んでいきましょう

